

Geïntegreerde gewasbestuur – Mielies




Lewensiklus van 'n Snywurm



VOLWASSENE

- Volwasse motte is nagdiere en kom snags te voorskyn om te paar en eiers te lê.
- Volwasse motte is redelik groot met 'n vlerkspan van 38-42 mm.
- Voorvlerke van manlike motte is dikwels bleek, terwyl wyfies s'n grysbruin is.
- Groot boontjiemerke op die vlerke van motte.




EIERS

- Wyfietmotte kan nagenoeg 1 000 eiers lê.
- Dit word op die grondoppervlak/tussen die boonste gronddeeltjies gelê, maar as die grond nat is, kan eiers op plantstingels gelê word.
- Eiers word gedurende die herfs of winter gelê en kan vogtige en koue toestande weerstaan.
- Eiers is wit-geel en word donkerder soos hulle ontwikkel.
- Tydsduur: Eiers broei uit in 4-7 dae in die somer of 10-14 dae in die winter.

Papiefase: 14 – 17 dae

- Papies is donkerbruin, amper swart van kleur.
- Ongeveer 15-19 mm lank.
- Larwes vorm grondselle (*earthen cells*) en word 'n papie binne hierdie selle onder die grondoppervlak.



PAPIE

Lewensiklus van 'n snywurm (*Agrotis spp.*)

Periode van eier tot mot:
Somer: 60 dae
Winter: 120 dae
Generasies: 3-4 per jaar

Larwestadium: 42-120 dae

Temperatuur het 'n groot impak op die larweperiode. Gedurende die somer kan dit so kort as 42-56 dae wees en gedurende die winter kan dit so lank as 100-120 dae wees.


- Larwes is donkergrys tot bruin.
- Nuut uitgebroeide larwes is 3 mm lank en kan tot 39 mm groei.

Larwestadium 42-120 dae

Klein larwes (L1-L3) bly hoofsaaklik bo die grond. Rosetvormende onkruid bied skuiling en dien as 'n voedselbron vir klein larwes, terwyl groot larwes (L4-L6) skuiling in die grond soek en slegs te voorskyn kom wanneer hulle kos soek.



BESKADIGDE PLANT



LARWE

Snywurms (*Agrotis spp.*)

Snywurmlarwes word gekenmerk deur hul vuilgrys en bruin voorkoms en is veral snags aktief wanneer hulle saailinge by die grondlyn afsny. Oorwinterende onkruid is die dryfveer agter hoë snywurmbesmettings omdat dit as 'n voedselbron dien en skuiling aan larwes bied. Die beheer van oorwinterende onkruid sal die vlak van besmetting vroeg in die plantseisoen aansienlik verminder.

