

NOVINKA



Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

Fungicid se stimulačním působením

Inovativní přístup k úspěšnému řešení širokého spektra houbových chorob pro podporu tvorby výnosu za různých povětrnostních podmínek.



**UDRŽITELNOST
JE ZÁKLAD**

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

cropscience.bayer.cz



Cayunis®

Víc než jen fungicid

Profil přípravku

Složení (FRAC skupina)

bixafen 75 g/l (7/C2)
spiroxamine 150 g/l (5/G2)
trifloxystrobin 100 g/l (11/C3)

Formulace

EC - emulgovatelný koncentrát

Plodiny (termín aplikace)

ječmen (BBCH 30–61)
pšenice (BBCH 30–69)
žito (BBCH 30–69)
tritikale (BBCH 30–69)

Spektrum

listové choroby obilnin

Dávkování

0,8–1 l/ha (200–400 l/ha vody)

Počet aplikací v plodině

maximálně 2× (interval 21 dnů)

Ochranná lhůta

AT (dána odstupem aplikace a sklizně)

Odstup srážek od aplikace

1 hodina (po zaschnutí na listech)

Balení

kanystr 5 l

Podpora tvorby výnosu obilnin za různých povětrnostních podmínek

-  tři odlišné mechanismy působení v jedné formulaci
-  dlouhodobá ochrana proti širokému spektru chorob
-  podpora rozvoje listové plochy a celkové vitality rostlin
-  anti-stresové působení a rychlejší regenerace rostlin
-  úsporné hospodaření rostlin s vodou za sucha


Komplexní systém ošetření obilnin

Pšenice ozimá

0,8–1 l/ha



T1–T2




Ječmen jarní

0,8–1 l/ha



T1–T2




Doporučení pro aplikaci

Cayunis® lze aplikovat v širokém aplikačním intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení pšenice, žita a tritikale a do počátku kvetení ječmene. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení je doporučeno používat dávku 1 l/ha. V případě nižšího tlaku a výskytu chorob nebo při použití ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 0,8 l/ha.

Cayunis® se aplikuje preventivně, nebo na základě prognózy (signalizace) na počátku výskytu chorob. Ošetření se obvykle provádí tak, aby byla ochráněna listová patra a praporcový list.

Cayunis® je velmi vhodný pro první fungicidní ošetření obilnin v termínu T1–T2 s využitím dlouhodobého preventivního fungicidního a stimulačně fyziologického působení.

ramuláriová
skvrnitost ječmene




rhynchosporiová
skvrnitost ječmene



hnědá
skvrnitost ječmene



rez
ječná




helminthosporiíza
pšenice




braničnatka
pšeničná



braničnatka
plevová



padlí
travní



rez
pšeničná




rez
plevová



rez
žitná



rhynchosporiová
skvrnitost (žito)



0,75 l/ha

PROSARÖ

T3



0,75–1 l/ha

PROSARÖ

T3



71–92

Přínos pro pěstitele obilnin

- dlouhodobá fungicidní ochrana
- široké spektrum listových chorob
- podpora asimilačních procesů v rostlině
- vysoká odolnost dešťovým srážkám
- není vyloučen z OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod

Technicko-poradenský servis

JB	Ing. Jan Brzkovský	602 704 488 jan.brzkovsky@bayer.com
ZG	Ing. Zbyněk Graman	724 220 168 zbynek.graman@bayer.com
VH	Ing. Vladimír Hladík	602 594 934 vladimir.hladik@bayer.com
VJ	Ing. Jan Válek	774 957 997 jan.valek@bayer.com
PH	Pavel Holub	606 705 906 pavel.holub@bayer.com
VK	Vít Košťál	727 900 977 vit.kostal@bayer.com
PK	Ing. Petr Kolín	771 230 074 petr.kolin@bayer.com
VM	Ing. Vlastislav Michálek	602 371 163 vlastislav.michalek@bayer.com
MP	Ing. Marie Požárová	721 911 619 marie.pozarova@bayer.com
LP	Ing. Libor Pavlíček	731 612 605 libor.pavlicek@bayer.com
JH	Ing. Johanka Hypiusová	771 230 075 johanka.hypiusova@bayer.com
MT	Ing. Markéta Tržilová	607 731 784 marketa.trzilova@bayer.com
JV	Bc. Jaroslav Vaško	601 392 531 jaroslav.vasko@bayer.com
ZF	Ing. Zdeněk Folk	602 419 089 zdenek.folk@bayer.com
PV	Ing. Petr Vlažný	602 371 160 petr.vlazny@bayer.com
MH	Ing. Martin Hradecký	602 202 496 martin.hradecky@bayer.com

