



decis[®]
trap



Musca cireșelor
Rhagoletis cerasi



**Protecție inovatoare
împotriva muștei
cireșelor**




Prezentarea problemei

Musca cireșelor (*Rhagoletis cerasi*) este cel mai semnificativ dăunător al cireșelor din punct de vedere economic.

Ouăle sunt depuse în momentul schimbării culorii fructelor. Larva eclozată pătrunde ulterior în fructe și provoacă pierderi considerabile în ceea ce privește calitatea.

➔ **daune economice semnificative**



- Alcătuire: recipientul cu substanță de atragere a muștelor în capcană și 0,015 g deltametrin /capcană
- Aplicare: la o dimensiune a fructelor de peste 10 mm
- Consum: 100 capcane / ha
- Fără reziduuri în fructe
- Nu este necesar un timp de așteptare până la recoltare



Mod de acțiune

Cu ajutorul substanței specifice, capcana atrage muștele prin orificiile laterale din recipient. Interiorul capacului capcanei este impregnat cu deltametrin, formularea este rezistentă la radiații UV. Insecta atrasă în capcană încearcă să zboare în sus, spre lumină și se lovește de latura interioară a capacului, intră în contact cu ingredientul activ de pe capac și astfel moare.



Avantajele capcanei muștei cireșelor Decis® Trap


- Poate fi folosită imediat, nu necesită material suplimentar de prindere.
- Utilizatorul nu intră în contact cu substanța.
- Nu prezintă reziduuri.
- Nu necesită timp de pauză.
- Atât atractantul cât și substanța activă deltametrin sunt protejate împotriva intemperiilor.
- Substanța folosită ca atractant este specifică atragerii muștei cireșelor. Albinele și celelalte insecte benefice nu sunt afectate.

Rezultatele testelor

Comparație între capcana Decis® Trap și schema standard cu 3 până la 4 aplicări de insecticide convenționale.



Proporția de fructe atacate în % (media a 13 loturi)



Recomandare de utilizare

- Capcanele pot fi folosite imediat după scoaterea din ambalaj. Nu sunt necesare intervenții suplimentare pentru activarea lor.
- Agățarea capcanelor pe ramurile orientate spre sud, la o înălțime cuprinsă între 1,80 și 2 metri, la începutul sezonului de zbor. Capcanele trebuie agățate sub un „acoperiș” protector de frunze pentru a le proteja împotriva razelor solare. Se vor respecta avertizările regionale din partea autorităților.
- Orificiile recipientelor nu trebuie să fie blocate de frunze sau alte obstacole.
- Capcanele trebuie să fie distribuite uniform (100 capcane/ha) pe suprafață.
- Creșteți numărul capcanelor pe marginea exterioară a suprafețelor mari, dacă sunt așteptate atacuri ale muștelor.
- Capcanele Decis® Trap ar trebui folosite ca parte integrantă a conceptului de tratament, împreună cu insecticidele convenționale, pentru a asigura o combatere eficientă.



Numărul autorizației: 555PC/20.11.2019

Bayer SRL, Șoseaua București-Ploiești, nr. 1A, corp B, etaj 1,
013681 București
Tel: 021 529 59 00; Fax: 021 529 59 90

Folosiți cu atenție pesticidele. A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucțiunile.

CITIȚI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ÎNAINTEA UTILIZĂRII!

Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență: (021) 318 36 20/ interior 235 sau (021) 318 36 06 (Luni-Vineri, 8:00-15:00), Institutul Național de Sănătate Publică sau +1 (760) 476-3964 (24 h din 24), nivel global. Relații suplimentare inclusiv Fișa cu Date de Securitate se pot obține de la: www.cropsience.bayer.ro; Bayer SRL/divizia Crop Science România
Tel.: 021.529.59.00; Fax: 021.529.59.98



© Marca înregistrată Bayer