



Hortícolas Invernadero

Con la comida no se juega

Catálogo de productos



Catálogo de productos

Hortícolas Invernadero

Índice

INSECTICIDAS / NEMATICIDAS

-  Velum®
-  Velsinum® **NUEVO**
-  BioAct® Prime
-  Sivanto® Prime
-  FLIPPER®
-  Decis® EVO
-  Vynyty® Tuta Press

FUNGICIDAS

-  Previcur® Energy
-  Volare®
-  Teldor®
-  Luna® Sensation
-  Serenade® Aso
-  Flint®
-  Elosal® GD

DIVERSOS

-  Aquasoft®
-  Bayfolan® Aktivator
-  Bayfolan® Algae
-  Ergostim® XG
-  Folamina®
-  Fruitone® SL
-  Torneo® Top

SOLUCIONES DIGITALES

-  Nematool®
-  ReslYou®





INSECTICIDAS / NEMATOCIDAS

- // Máxima eficacia frente a larvas infectivas J2 d e *Meloidogyne incognita*, *javanica* y *arenaria*.
- // Protección frente a oídio desde el inicio, retrasando su aparición. 2 pases autorizados en el cultivo.
- // Respetuoso con la microbiota beneficiosa del suelo y perfecto acompañante del resto de estrategias pre-trasplante.

VELUM
PRIME

ver más

Materia activa / composición				Envases		Tipo de formulación		
Fluopyram 40%				0,5 litros		Suspensión Concentrada (SC)		
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos	Plazo de seguridad
Berenjena Melón Pimiento Sandía Tomate	Nematodos Oídio	0,375- 0,625 L/ha	2	15-30 días	2000-6000	Primera aplicación: 1-3 días antes o después del trasplante Segunda aplicación: 15-30 días después del trasplante	Riego por goteo en pre o postsiembra/ trasplante	3 días
Calabacín Pepino								1 día

NUEVO

- // Eficacia frente a larvas infectivas J2 de nematodos gracias al modo de acción del polisulfuro de dialilo.
- // Sin residuos, ideal para combinar en programas de tratamiento nematicidas con ovidas.
- // Hasta 6 tratamientos por ciclo, con posibilidad de aplicación desde trasplante hasta recolección.



Nelsinum

ver más

Materia activa / composición				Envases		Tipo de formulación		
Polisulfuro de dialilo derivado de extracto de ajo 100%				1 y 5 litros		Suspensión concentrada (SC)		
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos	
Berenjena Pimiento Tomate	Nematodos	2-4 L/ha	6	10	1.000-30.000	00-89	Aplicar (siembra/trasplante)	No procede plazo de seguridad.
Calabacín Pepino								
Calabaza Melón Sandía								



INSECTICIDAS / NEMATICIDAS



// Con registro, eficaz frente a huevos de *Meloidogyne*.

// Ideal para combinar con Velum® y Nematool® en estrategias de control de nematodos.

// Sin residuo ni LMR.

BioAct
PRIME

ver más



Materia activa / composición

Purpureocillium lilacinum (Cepa 251) 21,6%

Envases

0,5 litros

Tipo de formulación

Concentrado dispersable en agua (DC)

No procede plazo de seguridad.

Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Condicionantes específicos	BBCH
Berenjena Calabacín Melón Pepino Pimiento Sandía Tomate	Nematodos	0,75 L/ha	7	(*)	1000-10000	Para aplicación en bandeja la dosis será 0.05%-0.075%	(*)

(*) Aplicación al suelo mediante riego por goteo o rociado a baja presión (a todo terreno, en bandas, al surco o alrededor de la planta). Para volúmenes de caldo inferiores a 1.000 L/ha, realizar posteriormente un riego adicional. Cultivos herbáceos: 1ª aplicación: 0-4 días después de la siembra, o bien 7-14 días antes del trasplante. Tratamiento seguido de riego y/o incorporación mecánica. 2ª aplicación: Durante el trasplante; o bien de 4 a 6 semanas después de la siembra; o bien mediante rociado de bandejas de semillero a una concentración de 0,05-0,075%. 3ª aplicación y siguientes: 4-6 semanas después de la siembra o trasplante, a intervalos de 4-6 semanas.

// Mejores eficacias del mercado frente a pulgón, mosca blanca y efecto complementario sobre chinches del pimiento.

// Doble efecto de choque y sistémico, con protección hasta 21 días.

// Mayor velocidad de acción del mercado, con hasta 2 aplicaciones por campaña registradas.

SIVANTO
prime

ver más



Materia activa / composición

Flupiradifurona 20%

Envases

1 y 5 litros

Tipo de formulación

Líquido soluble (SL)

Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos	Plazo de seguridad
Berenjena Calabacín Pepino Pimiento Tomate	Mosca blanca Pulgón	0,05-0,075%	2	10 días	300-1500	12-89	Cultivo en invernadero y/o protegido	3 días
Sandía	Mosca blanca Pulgón	0,05-0,075%	2	10 días	300-750	12-89	Cultivo en invernadero y/o protegido	3 días

IR A ÍNDICE



INSECTICIDAS / NEMATICIDAS



- // Con registro fitosanitario, máxima eficacia demostrada entre los productos de su gama.
- // Espectro multiplaga y efecto complementario sobre enfermedades foliares.
- // Sin residuo ni LMR, ideal para integrar en estrategias de control integrado.

FLIPPER®

[ver más](#)

Materia activa / composición

Sales potásicas de ácidos grasos C14-C20 48%

Envases

5 y 10 litros

Tipo de formulación

Emulsión de aceite en agua (EW)

No procede plazo de seguridad.

Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos
Berenjena Pimiento Tomate	Ácaros Mosca blanca Pulgón Trips <i>Tuta absoluta</i>	1% (máx 10 L/ha)	5	7	300-1000	10-89	En pimiento, máxima dosis de 0,75% y prueba varietal recomendada
Calabacín Melón Pepino Sandía	Ácaros Mosca blanca Pulgón Trips	1% (máx 10 L/ha)	5	7	300-1000	10-89	-



INSECTICIDAS / NEMATOCIDAS

- // Piretroide de referencia, con más de 40 años en el mercado.
- // Acción de contacto inmediata con alto nivel de eficacia y comodidad para el usuario.
- // Amplio espectro de plagas objetivo en cada aplicación.



ver más

Materia activa / composición		Envases		Tipo de formulación		
Deltametrin 2,5%		0,25, 1 y 5 litros		Emulsión de aceite en agua (EW)		
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Plazo de seguridad
Berenjena Pimiento	Chinches Coleópteros Lepidópteros Mosca blanca Pulgón Trips	0,5-0,7 L/ha	4	7 días	1000-1500	3 días
Calabacín Pepino	Dípteros Mosca blanca Pulgón Trips	0,5-0,7 L/ha	4	7 días	1000-1500	3 días
Melón Sandía	Dípteros Pulgón Trips	0,5-0,7 L/ha	3	7 días	800-1000	3 días
Tomate	Chinches Coleópteros Lepidópteros Pulgón Trips	0,3-0,5 L/ha	3	7 días	1000-1500	3 días
	Mosca blanca	0,5 L/ha	3	7 días	1000-1500	3 días

- // Duración media de 120 días en campo, reduciendo la mano de obra.
- // Ofrece hasta un 40% de ahorro de tiempo en la aplicación, libre de plásticos y biodegradable.
- // Apto en sistemas de producción integrada y producción ecológica.



ver más

Materia activa / composición			Envases		Tipo de formulación	
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1- yl acetato (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1- yl acetato 3,1% p/p			0,25 litros		Difusor de vapor (VP)	
No procede plazo de seguridad.						
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Condicionantes específicos	
Berenjena Pimiento Tomate	<i>Tuta absoluta</i>	750 puntos de difusión (gel)/ha = 4 a 6 bolsas/ha (1-1,5 kg/ha)	4	90-120 días	Método de aplicación: Depósito de puntos de gel en material inerte dispuesto en invernaderos	

IR A ÍNDICE



- // Hasta 2 tratamientos en campo y 2 de semillero, reconocida eficacia frente a un amplio rango de hongos oomicetos.
- // Autorizado para uso foliar en tomate y pepino, recomendable iniciar tratamientos a inicio de condiciones de mildiu.
- // Excelentes eficacias, incluso en las condiciones de mildiu más desafiantes.

PREVICUR[®]
ENERGY[ver más](#)

Materia activa / composición			Envases		Tipo de formulación			
Fosetil 31% Propamocarb 53%			1 y 5 litros		Líquido soluble (SL)			
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos	Plazo de seguridad
Berenjena Calabacín Melón Pimiento Sandía	<i>Phytophthora Pythium</i>	3 cc/m ²	2	14 días	-	En semillero	-	3 días
		0,15 ml/planta	2	7-14 días	Riego por goteo	Asiento en suelo natural	-	
		0,15 ml/planta	4	2 primeras 10-15 días 2 últimas 7 días	Riego por goteo	Asiento en suelo artificial	-	
Pepino Tomate	<i>Phytophthora Pythium</i>	3 cc/m ²	2	14 días	-	En semillero	-	3 días
		0,15 ml/planta	2	7-14 días	Riego por goteo	Asiento en suelo natural	-	
		0,15 ml/planta	4	2 primeras 10-15 días 2 últimas 7 días	Riego por goteo	Asiento en suelo artificial	-	
	Mildiu	2,5 L/ha	2	7 días	500-1500	14-89 Pepino 16-85 Tomate	Pulverización foliar con lanza, pistola o mochila	



- // Hasta 2 aplicaciones frente a mildiu en cucurbitáceas, con alta eficacia y persistencia.
- // Actúa sobre diferentes estados del ciclo del patógeno, con un control elevado, consistente y duradero.
- // Ideal para integrar en estrategias de mildiu con diferentes materias activas.

Volare®[ver más](#)

Materia activa / composición		Envases		Tipo de formulación		
Propamocarb 52,5% (clorhidrato) Fluopicolida 6,25%		1 y 5 litros		Suspensión Concentrada (SC)		
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Plazo de seguridad
Calabacín Pepino	Mildiu	0,14-0,16%	2	7	-	1 día
Melón Sandía	Mildiu	0,14-0,16%	2	7	-	3 días

- // Estándar químico de futuro frente a *Botrytis*, especialmente en aplicaciones a final del ciclo.
- // Cortísimo plazo de seguridad: 1 día en hortalizas.
- // Efecto translaminar y nueva formulación líquida SC, con excelente resistencia al lavado y con mínimo depósito tras la aplicación.

TELDOR®[ver más](#)

Materia activa / composición					Envases		Tipo de formulación	
Fenhexamida 50%					1 litro		Suspensión Concentrada (SC)	
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos	Plazo de seguridad
Berenjena Tomate	Botrytis	1,25 L/ha	3	7 días	300-1000	55-89	Manual con lanza o pistola al 0.1-0.15%, con un máximo de 1,25 L/ha	1 día
							Manual con mochila al 0.1-0.15%, con un máximo de 1,5 L/ha.	
Calabacín Pepino	Botrytis	1,25 L/ha	3	8 días	300-1000	55-89	Manual con lanza o pistola al 0.1-0.15%	1 día
							Manual con mochila al 0.1-0.15%, con un máximo de 1,5 L/ha.	
Pimiento	Botrytis	1,25 L/ha	3	8 días	300-1000	55-89	Manual con lanza o pistola al 0.1-0.15%, con un máximo de 1,25 L/ha	1 día
							Manual con mochila al 0.1-0.15%, con un máximo de 1.5 L/ha	



- // Alta eficacia frente a *Botrytis* y efecto complementario frente a oidio en pimiento, con protección duradera.
- // Eficacias superiores al 90% en programas de tratamiento con hasta dos aplicaciones consecutivas.
- // Producto de referencia en el cultivo de pimiento, aumenta la vida útil poscosecha.



ver más



Materia activa / composición			Envases		Tipo de formulación		
Fluopyram 25% Trifloxistrobin 25%			1 y 3 litros		Suspensión Concentrada (SC)		
Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Plazo de seguridad
Pimiento	<i>Botrytis</i>	0,04%	2	10-14	500-1500	51-89	3 días

- // Máxima producción de la cepa QST713 de compuestos antifúngicos y antibacterianos responsables del efecto fungicida.
- // Cepa exclusiva de Bayer, especialmente seleccionada por su alto nivel de eficacia entre millones de candidatos.
- // Sin residuo ni LMR, óptimas propiedades de mezcla.



ver más



Materia activa / composición			Envases		Tipo de formulación		
<i>Bacillus subtilis</i> (cepa QST 713) 1,34%			5 y 10 litros		Suspensión Concentrada (SC)		

No procede plazo de seguridad.

Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Condicionantes específicos
Berengena Pimiento Tomate	<i>Fusarium</i>	10 L/ha	1	-	200-500	00-13	Pulverización al suelo o riego por goteo
	Bacteriosis	4-8 L/ha	6	5	200-1500	13-89	-
	<i>Alternaria Botrytis</i>	8 L/ha	6	5-14	500-1000	21-89	-
Calabacín Melón Pepino Sandía	<i>Fusarium</i>	10 L/ha	1	-	200-500	00-13	Pulverización al suelo o riego por goteo
	<i>Botrytis</i>	4-8 L/ha	6	5	200-1500	13-89	-



- // Control de oídio en varios cultivos.
- // Hasta 3 tratamientos por campaña, ideal para integrar en estrategias antioídio.
- // Cortísimo plazo de seguridad: 1 día en pimiento y tomate. 3 días en melón y calabacín.

[ver más](#)

Materia activa / composición

Envases

Tipo de formulación

Trifloxistrobin 50%

0,3 kilos

Gránulo mojable (WG)

Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Condicionantes específicos	Plazo de seguridad
Calabacín Pepino	Oídio	0,025%	4	7	No sobrepasar 375 g/ha por aplicación	3 días
Melón	Oídio	0,25 kg/ha	4	7	No sobrepasar 250 g/ha por aplicación	3 días
Pimiento	Oídio	0,025%	3	7	No sobrepasar 200 g/ha por aplicación	1 día
Tomate	Oídio	0,025%	3	7	No sobrepasar 375 g/ha por aplicación	1 día

- // Acaricida y fungicida preventivo en diversos cultivos.
- // Ideal en programas de tratamiento frente a ácaros, en combinación con FLIPPER®.

Elosal
GD[ver más](#)

Materia activa / composición

Envases

Tipo de formulación

Azufre 80%

10 kilos

Gránulo mojable (WG)

No procede plazo de seguridad.

Cultivo	Agente	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH
Calabacín Melón Pepino Sandía	Ácaros Araña roja Oídio	0,25-0,75%	8	7	500-1.000	BBCH 13-87
Tomate	Ácaros (Vasates) Araña roja Oídio	0,25-0,75%	8	7	500-1.000	BBCH 13-87



// Acondicionador de aguas diseñado por Bayer para evitar problemas de precipitaciones, floculaciones y oclusión de filtros y boquillas.

// Ideal para combinar con productos a base de sales alcalinas de ácidos grasos.

// Actúa incluso en aguas extraordinariamente duras.

Aquasoft

Materia activa / composición

Ácidos y sales orgánicas: 18,00% m.m
Agente anti-floculante: 33,50% m.m

Envases

1 y 5 litros

Tipo de formulación

Líquido soluble (SL)

No procede plazo de seguridad.

Cultivo

Hortícolas

Agente

Acondicionador de aguas

Dosis

0,10%

Aplicaciones máximas

-

// Potente bioestimulante y fisioactivador de aplicación en los momentos críticos del cultivo, como el estrés por frío.

// Garantiza los mejores resultados en floración, brotación, formación de frutos y/o momentos de estrés del cultivo.

// Estimula las defensas naturales de la planta aumentando la productividad.

Bayfolan[®]

AKTIVATOR

ver más

**Materia activa / composición**

Aminoácidos libres totales 7,9% p/p
Ácido fúlvico 2% p/p
Boro (B) 0,04% p/p
Manganeso (Mn) 0,4% p/p
Zinc (Zn) 1,2% p/p

Envases

5 y 15 litros

Tipo de formulación

Líquido soluble (SL)

Cultivo

Hortalizas de fruto
y legumbres

Dosis

1-3 L/ha

**Aplic.
máx.**

6

**Frecuencia
de aplicación**

7-14 días

**Volumen de
caldo (L/ha)**

200-1500

BBCH

De la siembra a la madurez del fruto:
brotación, floración y desarrollo
del fruto

**Tipo de
aplicación**

Foliar o riego
por goteo



DIVERSOS



- // Máxima concentración de compuestos bioactivos, menor dosis por Ha del mercado (1-2 L/Ha)
- // Contiene la mayor proporción del mercado de alginato, fucoidano y laminarina, en un peso molecular absorbible por la planta.
- // Con certificado europeo, extracción en caliente de algas intertidales con el mayor efecto bioestimulante

[ver más](#)

Materia activa / composición				Envases	Tipo de formulación	
Extracto de algas marinas (CMC1) (CAS 84775-78-0)				1 y 5 litros	Líquido	
Cultivo	Dosis	Aplic. máx.	Frecuencia de aplicación	(Volumen de caldo L/Ha)	BBCH	Tipo de aplicación
Hortícolas ornamentales y plantas aromáticas y medicinales	1-2 L/Ha	4	14 días	600-1.000 L/Ha	Desde la emergencia hasta la cosecha de hortalizas de hoja, tallo, raíz o bulbo	Pulverización foliar
				1.000 L/Ha	Crecimiento vegetativo, floración, cuajado y desarrollo del fruto	Aplicación al suelo
	0,5-1 L/Ha	3-4		400-6000 L/Ha	Crecimiento vegetativo, floración, cuajado y desarrollo del fruto	Pulverización foliar
	0,5-2 L/Ha	4		200-600 L/Ha	Crecimiento vegetativo, floración, cuajado y desarrollo del fruto	Pulverización foliar
		5		1.000 L/Ha	Pre-floración, floración, cuajado del fruto, desarrollo y maduración temprana	Drenaje del suelo

- // Aplicación en trasplante, floración o engorde de fruto, foliar o vía riego.
- // Favorece el desarrollo vegetativo y la defensa en momentos de estrés.
- // Mayor cantidad y calidad de cosecha.

Ergostim[®] xg[ver más](#)

Materia activa / composición		Envases	Tipo de formulación
AATC (ácido N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico) 2,75% ATC (ácido tiazolidin-4-carboxílico) 2,75% Glicina 6,70%		1 litro	Líquido soluble (SL)
Cultivo	Dosis	BBCH	
Hortícolas	50-100 cc/hl	Trasplante, Floración y engorde de frutos	

[IR A ÍNDICE](#)



- // De aplicación foliar, estimula las defensas naturales de las plantas y optimiza la fertilización.
- // Aumenta la productividad, favoreciendo la brotación, floración y desarrollo de frutos.
- // Estimula las defensas naturales de la planta, aumentando la productividad y además aumentando la eficacia de los fitosanitarios sistémicos.

Folamina®

[ver más](#)

Materia activa / composición			Envases	Tipo de formulación
Aminoácidos libres: 24,0% p/p Nitrógeno total (N): 8,0% p/p Nitrógeno orgánico: 7,3% p/p Materia orgánica total: 50,0% p/p			5 y 20 litros	Líquido soluble (SL)
Cultivo	Dosis	Aplic. máx.	BBCH	Tipo de aplicación
Hortícolas	0,1-0,2%	3	En intervalos de 10-15 días, en épocas de mayor actividad vegetativa: prefloración, formación del fruto, periodos críticos y tras circunstancias climatológicas adversas	Pulverización foliar

- // Fitorregulador destinado a inducir el cuajado de flores.
- // Además, estimula la actividad vegetativa del cultivo después de un período de crisis.

Fruitone®

[ver más](#)

Materia activa / composición			Envases		Tipo de formulación		
ANA (0,602% p/p) ANA-AMIDA (1,61% p/p)			1 y 5 litros		Líquido Soluble (SL)		
Cultivo	Objetivo	Dosis	Aplic. máx.	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	BBCH	Plazo de seguridad
Berenjena Tomate	Inducir cuajado flores	0,4 L/ha	1	-	Pulverización: 600	51-89	3 días
	Estimular actividad vegetativa	1 L/ha	6	10-12 días	Goteo: 40.000	51-89	1 día
Melón Sandía	Inducir cuajado flores Estimular actividad vegetativa	0,4 L/ha	1	-	300-500	Al inicio de la floración o después de periodo de crisis	3 días



// Contiene un 6% de hierro soluble, quelatado en forma EDDHA, con un porcentaje muy elevado como estereoisómero orto-orto (mínimo 5,7%).

// La mayor eficacia para la corrección de la clorosis férrica por vía radicular.

Torneo[®]

TOP

[ver más](#)**Materia activa / composición**

Hierro (Fe) soluble en agua 6.0% p/p
Hierro (Fe) quelado por [o,o] EDDHA 5.7% p/p

Envases

5 kilos

Tipo de formulación

Microgránulo dispersable

No procede plazo de seguridad.

Cultivo**Dosis****Aplic.
máx.****Intervalos****Volumen de
caldo (L/ha)****BBCH**

Hortalizas, florales y
ornamentales

0,5 -8 g/m²

-

-

-

Al inicio de la actividad vegetativa, en el momento de la plantación o en plena vegetación.



- // Evalúa la calidad de la solarización en función de la temperatura acumulada en suelo, permitiendo tomar la mejor decisión agronómica en relación a la cantidad de días de uso del plástico.
- // Permite identificar los momentos ideales de tratamiento con nematicidas ovicidas y larvicidas, para asegurar la mejor eficacia.
- // Nuevo modelo J2, que permite identificar los momentos óptimos de tratamiento con larvicidas biológicos. Completa el ciclo con el modelo ovicida ya existente.

nemaTQOL
by Bayer

Herramienta de evaluación de la solarización y recomendación de aplicaciones nematicidas.

El modelo **Nematool**, **BioAct® Prime** y **Velsinum®**

Gracias a los datos recopilados en base a la temperatura del suelo y el método de grados/día acumulados, el sistema te enviará una recomendación sobre **el mejor momento para aplicar BioAct® Prime y Velsinum®**, nuestros nematicidas biológicos.



- // Permite predecir los niveles de residuos fitosanitarios en recolección, para asegurar un óptimo manejo de las explotaciones por parte de técnicos y del departamento de calidad.
- // Ya disponible en tomate, expansión prevista en nuevos cultivos hortícolas en 2026.
- // Todas las materias activas autorizadas en el cultivo contempladas

ResiYou
by Bayer

La herramienta inteligente para gestionar los residuos de productos fitosanitarios.

Ahora también para TOMATE



