

Guia de *Variedades*



Se é Algodão, é Bayer.
Se é Bayer, é bom.



Sumário



BIOTECNOLOGIAS

Proteção contra lagartas.....	6
Manejo de plantas daninhas.....	7
Refúgio estruturado	8

VARIEDADES

<u>LANÇAMENTO</u> DP 2335 B3XF.....	12
<u>LANÇAMENTO</u> DP 2356 XF	14
DP 2252 B3XF.....	16
DP 2297 B3XF	18
<u>LANÇAMENTO</u> DP 2104 B3RF	20
DP 2111 B3RF.....	22
DP 2176 B3RF	24
DP 2077 B3RF.....	26
DP 1949 B3RF	28
DP 1866 B3RF	30
DP 1857 B3RF	32

Inovar para evoluir

Nosso compromisso com
o algodão brasileiro.

O algodão é uma cultura estratégica e essencial
para a economia do Brasil.

Neste cenário, a Bayer, líder global em agricultura,
assume o compromisso constante com a inovação
e consolida a evolução da cotonicultura brasileira
com Deltapine® e a tecnologia Bollgard®.



2005

2008

2013

2021


2024



Bollgard® 3

Proteção contra as
principais lagartas

Solução com
combinação única
de proteínas



Bollgard 3 preserva o potencial produtivo e a qualidade da fibra, com proteção contra as principais lagartas que afetam a cultura do algodão.

Curuquerê-do-algodoeiro
Alabama argillacea

Falsa-medideira
Chrysodeixis includens

Lagarta-da-maçã
Chloridea virescens

Lagarta-rosada
Pectinophora gossypiella

Lagarta-da-maçã/Espiga
Helicoverpa armigera

Complexo Spodoptera
Spodoptera spp.

RRFlex®

Tolerância ao
glifosato

XtendFlex®

Tolerância a
glifosato,
+ dicamba e
+ glufosinato de amônio

Espectro mais amplo
no controle de plantas
daninhas

Para ambos:




Aplicação
em diferentes
estágios de
desenvolvimento



Redução do
impacto das
plantas daninhas
em fases críticas
da cultura

Refúgio estruturado



RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS:

- 20% da área total;
- Variedades não Bt do mesmo ciclo;
- A distância máxima entre a área de refúgio e a área com a Bollgard® deve ser de 800 m;
- Não é recomendada a aplicação de inseticidas à base de Bt;
- A área de refúgio deve ser estruturada dentro da mesma propriedade.



MIP
Manejo Integrado de Pragas
REFÚGIO

**SUA PRODUÇÃO PROTEGIDA,
SUSTENTÁVEL E PRODUTIVA
POR MUITO MAIS TEMPO.**



Variedades
Deltapine®

Bollgard[®]3
RRFLEX

X *Bollgard[®]3*
TENDFLEX

X TENDFLEX

PRECOCE	MÉDIO	TARDIO	
	DP 1857 B3RF DELTAPINE DP 1866 B3RF DELTAPINE DP 1949 B3RF DELTAPINE DP 2104 B3RF DELTAPINE LANÇAMENTO		
DP 2111 B3RF DELTAPINE	DP 2335 B3XF DELTAPINE LANÇAMENTO	DP 2176 B3RF DELTAPINE	DP 2077 B3RF DELTAPINE
	DP 2252 B3XF DELTAPINE DP 2297 B3XF DELTAPINE		
	DP 2356 XF DELTAPINE LANÇAMENTO		



+ Alto teto produtivo

+ Flexibilidade no manejo de plantas daninhas

+ Estabilidade

CARACTERÍSTICAS

 **Ciclo Médio-Precoce**

 **Rendimento de fibra¹ 43,4 %**

 **Peso do capulho 4,9 g**

 **Exigência a regulador de crescimento Média**

 **Exigência de fertilidade Média/Alta**

 **Resposta a regulador de crescimento Alta**

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire..... **4,1**

Comprimento (mm) **31,3**

Uni. de comprimento (%) **83,8**

Resistência (gFor/Text)..... **30,5**

Índice de fibras curtas (%)..... **7,0**

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO			JANEIRO			FEVEREIRO
Bahia	90 – 105		90	90	90	100*	100*	100*	105
GO/MS	90 – 95			90	90	90	95		
MA/PI	90 – 100			90	90	90	95*	100*	100*
MG/SP	90		90	90	90	90	90*		
MT BR-163	90 – 100				90	90	90	100	100
MT Oeste	90 – 100				90	90	100	100	100
MT Sul	90 – 100				90	90	90	100	100
MT Vale do Araguaia	90 – 95			90	90	90	90	90	95

 Tolerado  Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

* Área irrigada

Reações às doenças

 **Doença azul e Bacteriose Resistente**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

Bollgard³ TENDFLEX



**+ Flexibilidade no manejo
de plantas daninhas**

+ Rusticidade

CARACTERÍSTICAS



Ciclo
Médio



Rendimento de fibra¹
44,9 %



Peso do capulho
5,3 g



Exigência a regulador de crescimento
Média



Exigência de fertilidade
Média/Alta



Resposta a regulador de crescimento
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire.....**4,2**

Comprimento (mm)**30,3**

Uni. de comprimento (%)**83,3**

Resistência (gFor/Text).....**31,0**

Índice de fibras curtas (%).....**7,5**

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO			JANEIRO			FEVEREIRO
Bahia	90 – 105		90	90	90	100*	100*	100*	105
GO/MS	90 – 95			90	90	90	95		
MA/PI	90 – 100			90	90	95	95*	100*	100*
MG/SP	90		90	90	90	90	90*		
MT BR-163	90 – 100				90	90	95	100	100
MT Oeste	90 – 100				90	90	100	100	100
MT Sul	90 – 100				90	90	95	100	100
MT Vale do Araguaia	90 – 95			90	90	90	90	95	95

● Tolerado ● Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

* Área irrigada

**Reações
às doenças**



**Doença azul e Bacteriose
Resistente**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.





+ Alto potencial produtivo

+ Flexibilidade no manejo de plantas daninhas

+ Sanidade

CARACTERÍSTICAS



Ciclo
Médio



Rendimento de fibra¹
43,3 %



Peso do capulho
5,0 g



Exigência a regulador de crescimento
Média



Exigência de fertilidade
Média/Alta



Resposta a regulador de crescimento
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire.....**4,4**

Comprimento (mm)**29,9**

Uni. de comprimento (%)**83,9**

Resistência (gFor/Text).....**30,7**

Índice de fibras curtas (%).....**7,0**

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO			JANEIRO			FEVEREIRO
Bahia	90 – 105		90	90	95	100*	100*	100*	105
GO/MS	90 – 95			90	90	95	95		
MA/PI	90 – 100			90	90	95	95	100*	100*
MG/SP	90		90	90	90	90	90*		
MT BR-163	90 – 100				90	90	95	100	100
MT Oeste	90 – 100				90	90	100	100	100
MT Sul	90 – 100				90	90	95	100	100
MT Vale do Araguaia	90 – 95			90	90	90	90	95	95

● Tolerado ● Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

* Área irrigada

Reações
às doenças



Doença azul
Resistente



Ramulária Raça 1
Moderadamente Resistente

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹ O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descaroçadeira de 10 serras.

Resaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

Bollgard³
TENDFLEX



+ Alto rendimento de fibra

+ Flexibilidade no manejo de plantas daninhas

+ Sanidade

CARACTERÍSTICAS



Ciclo
Médio



Rendimento de fibra¹
45,4 %



Peso do capulho
4,8 g



Exigência a regulador de crescimento
Média



Exigência de fertilidade
Média/Alta



Resposta a regulador de crescimento
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire.....**4,3**

Comprimento (mm)**30,0**

Uni. de comprimento (%)**83,8**

Resistência (gFor/Text).....**31,3**

Índice de fibras curtas (%).....**7,1**

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO			JANEIRO			FEVEREIRO
Bahia	90 – 105		90	90	95	100*	100*	100*	105
GO/MS	90 – 95			90	90	95	95		
MA/PI	90 – 100			90	90	95	95	100*	100*
MG/SP	90		90	90	90	90	90*		
MT BR-163	90 – 100				90	90	95	100	100
MT Oeste	90 – 100				90	90	100	100	100
MT Sul	90 – 100				90	90	95	100	100
MT Vale do Araguaia	90 – 95			90	90	90	90	95	95

● Tolerado ● Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

* Área irrigada

Reações às doenças



Doença azul e Bacteriose Resistente

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.





+ Alto potencial produtivo

+ Resistência à *M. incógnita*

CARACTERÍSTICAS

 **Ciclo Médio-Preceze**

 **Rendimento de fibra¹ 43,8 %**

 **Peso do capulho 5,3 g**

 **Exigência a regulador de crescimento Alta**

 **Exigência de fertilidade Média/Alta**

 **Resposta a regulador de crescimento Alta**

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire..... **4,3**

Comprimento (mm) **30,1**

Uni. de comprimento (%) **83,7**

Resistência (gFor/Text)..... **31,5**

Índice de fibras curtas (%)..... **7,5**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO				JANEIRO				FEVEREIRO
Bahia	95 – 105		95	95	100	105	100*	100*	100*	105*	
GO/MS	90 – 100			90	90	90	90	100*	100*	100*	
MA/PI	90 – 105				90	90	90*	100*	105*	105*	
MG/SP	90			90	90	90	90*	90*			
MT BR-163	85 – 95				85	85	90	95	95		
MT Oeste	85 – 100				85	85	90	90	95	100	
MT Sul	90 – 95						90	90	90	95	
MT Vale do Araguaia	85 – 95						85	90	90	95	

 Tolerado  Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

* Área irrigada

Reações às doenças



Ramulária Raça 1 e 2 Resistente



Nematode *M. incognita* Resistente



Doença azul e Bacteriose Resistente

Bollgard[®] 3
RRFLEX



+ Precocidade

+ Agressividade

**+ Resistência à
*M. incógnita***

CARACTERÍSTICAS



Ciclo
Precoce



Rendimento de fibra¹
42,4 %



Peso do capulho
5,4 g



Exigência a regulador de crescimento
Alta



Exigência de fertilidade
Média/Alta



Resposta a regulador de crescimento
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire.....**4,0**

Comprimento (mm)**30,9**

Uni. de comprimento (%)**83,9**

Resistência (gFor/Text).....**30,5**

Índice de fibras curtas (%)**7,2**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descaroçadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO				JANEIRO				FEVEREIRO
Bahia	95 – 105		95	95	100	105	100*	100*	100*	105*	
GO/MS	90 – 100			90	90	90	90	100*	100*	100*	
MA/PI	90 – 105				90	90	90*	100*	105*	105*	
MG/SP	90			90	90	90	90*	90*			
MT BR-163	85 – 95					85	85	90	95	95	
MT Oeste	85 – 100						85	90	90	95	100
MT Sul	90 – 95							90	90	95	
MT Vale do Araguaia	85 – 95							85	90	90	95

● Tolerado ● Recomendado

¹Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

*Área irrigada.

Reações
às doenças



Ramulária Raça 1 e 2
Resistente



Nematode *M. incognita*
Resistente



Doença azul e Bacteriose
Resistente

Bollgard³
RRFLEX



+ Alto teto produtivo

+ Estabilidade

+ Resistência à *M. incógnita*

CARACTERÍSTICAS

 Ciclo **Médio/Tardio**

 Rendimento de fibra¹ **44%**

 Peso do capulho **5,3 g**

 Exigência a regulador de crescimento **Média**

 Exigência de fertilidade **Média/Alta**

 Resposta a regulador de crescimento **Alta**

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire..... **4,3**

Comprimento (mm) **30,4**

Uni. de comprimento (%) **83**

Resistência (gFor/Text)..... **30,2**

Índice de fibras curtas (%) **7,2**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
Bahia	90		90 90 95 95		
GO/MS	80		80 80 90		
MA/PI	80 – 85		80 85 90		
MG/SP	80 – 90		80 80 85 90		
MT BR-163	80 – 85			90 90 90 90 95	
MT Oeste	80 – 85			85 90 90 90 95	
MT Sul	80 – 85			90 95 95 95 95	
MT Vale do Araguaia	80 – 85			80 80 80 85 90 90	

 Tolerado  Recomendado

¹Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

Reações às doenças



Ramulária Raça 1 e 2 Resistente



Nematóide *M. incógnita* Resistente



Doença azul e Bacteriose Resistente

Bollgard³
RRFLEX



CARACTERÍSTICAS



Ciclo
Tardio



Rendimento de fibra¹
46,1 %



Peso do capulho
4,2 g



Exigência a regulador de crescimento
Média/Alta



Exigência de fertilidade
Média/Alta



Resposta a regulador de crescimento
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire..... **4,1**

Comprimento (mm) **32,8**

Uni. de comprimento (%) **82,3**

Resistência (gFor/Text)..... **30,8**

Índice de fibras curtas (%) **6**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO	FEVEREIRO
Bahia	90		90	90	90				
GO/MS	80			80	80				
MA/PI	80 – 85				80	85	85		
MG/SP	80 – 90				80	80	90		
MT BR-163	80 – 85					80	80	85	
MT Oeste	80 – 85					80	80	85	
MT Sul	80 – 85				80	80	85	85	
MT Vale do Araguaia	80 – 85				80	80	80	80	85

● Tolerado ● Recomendado

¹Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

*Área irrigada.

Reações
às doenças



Doença azul e Bacteriose
Resistente

Bollgard[®]3
RRFLEX



+ Estabilidade

+ Alto potencial produtivo

+ Alto rendimento de fibra

+ Sanidade

CARACTERÍSTICAS

 **Ciclo**
Precoce/Médio

 **Rendimento de fibra¹**
45,9 %

 **Peso do capulho**
4,5 g

 **Exigência a regulador de crescimento**
Média

 **Exigência de fertilidade**
Média/Alta

 **Resposta a regulador de crescimento**
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire..... **4,1**

Comprimento (mm) **29,9**

Uni. de comprimento (%) **83,6**

Resistência (gFor/Text)..... **30,3**

Índice de fibras curtas (%)..... **7,6**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descarocadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO			JANEIRO			FEVEREIRO
Bahia	90 – 105		90	90	90	100*	100*	100*	105
GO/MS	90 – 95			90	90	90	95		
MA/PI	90 – 100			90	90	90	95*	100*	100*
MG/SP	90		90	90	90	90	90*		
MT BR-163	90 – 100				90	90	90	100	100
MT Oeste	90 – 100				90	90	100	100	100
MT Sul	90 – 100				90	90	90	100	100
MT Vale do Araguaia	90 – 95			90	90	90	90	90	95

 Tolerado  Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

*Área irrigada.

Reações às doenças



Ramulária Raça 1 Moderadamente Resistente



Doença azul Resistente

Bollgard³
RRFLEX



+ Responsivo em ambientes de alta produtividade

+ Destaque para áreas irrigadas

CARACTERÍSTICAS



Ciclo
Precoce/Médio



Rendimento de fibra¹
43,3 %



Peso do capulho
4,7 g



Exigência a regulador de crescimento
Média



Exigência de fertilidade
Alta



Resposta a regulador de crescimento
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire.....**4,4**

Comprimento (mm)**30,3**

Uni. de comprimento (%)**82,6**

Resistência (gFor/Text).....**31,1**

Índice de fibras curtas (%).....**8,2**

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO				JANEIRO			
Bahia	90 – 100						90*	100*	100*	100*
GO/MS	90		90	90	90	90				
MA/PI	90 – 105		90	90	90	95*	100*	105*	105*	
MG/SP	90		90	90	90	90				
MT BR-163	80 – 90					80	85	90	90	90
MT Oeste	80 – 90					80	85	90	90	90
MT Sul	80-90					80	85	90	90	90
MT Vale do Araguaia	80 – 90					80	80	80	80	90

● Tolerado ● Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

*Área irrigada.

Reações às doenças



Doença azul e Bacteriose Resistente

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descaroçadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

Bollgard³
RRFLEX



**+ Alto rendimento
de fibra**

+ Produtividade

+ Estabilidade

CARACTERÍSTICAS

 **Ciclo**
Precoce/Médio

 **Rendimento de fibra¹**
45,6 %

 **Peso do capulho**
4,3 g

 **Exigência a regulador de crescimento**
Média

 **Exigência de fertilidade**
Média/Alta

 **Resposta a regulador de crescimento**
Alta

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA

Micronaire.....**4,6**

Comprimento (mm) **30,1**

Uni. de comprimento (%) **82,8**

Resistência (gFor/Text)..... **30,9**

Índice de fibras curtas (%).....**8,0**

POSICIONAMENTO DE PLANTIO

REGIÃO	POPULAÇÃO ¹ (1000 plantas/ha)	NOVEMBRO	DEZEMBRO				JANEIRO			
Bahia	90 – 100						90*	95	100*	100*
GO/MS	90			90	90	90	90			
MA/PI	90 – 100					90	90	100*	100*	100*
MG/SP	90		90	90	90	90				
MT BR-163	80 – 95						80	85	90	90
MT Oeste	80 – 95						80	85	90	90
MT Sul	90 – 95							90	90	95
MT Vale do Araguaia	80 – 95						80	80	85	90

 Tolerado  Recomendado

¹ Reforçamos que o posicionamento de plantio deve ser ajustado conforme as condições específicas de cada agricultor, região e safra.

A adaptação às particularidades locais é essencial para maximizar o potencial da cultivar e os resultados produtivos. Nesse sentido, o bom senso e a expertise do profissional responsável são fundamentais para definir o melhor posicionamento de plantio para cada situação.

*Área irrigada

**Reações
às doenças**

 **Doença azul e Bacteriose
Resistente**

Os dados apresentados foram obtidos através de ensaios realizados pelo time de Desenvolvimento de Mercado.

¹O rendimento de fibra apresentado refere-se ao valor médio obtido em descaroçadeira de 10 serras.

Ressaltamos que os resultados podem variar dependendo das condições específicas de cultivo em cada região e safra.

Bollgard³
RRFLEX



deltapinseeds@bayer.com
www.deltapine.com.br



Se é Algodão, é Bayer.
Se é Bayer, é bom.